

## **Oversigt over nye regler i bekendtgørelse nr. 33 af 23. januar 2006 om opdræt af fjervildt (fjervildtbekendtgørelsen).**

*Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. februar 2006 og ophæver samtidig bekendtgørelse nr. 1000 af 20. oktober 2005 om opdræt af fjervildt.*

*Mindre ændringer af redaktionel karakter er ikke medtaget i denne gennemgang.*

### **Bekendtgørelsens anvendelsesområde:**

- Bekendtgørelsen omfatter nu alle opdræt af fjervildt med en årlig produktion på over 100 fugle eller 200 æg, i modsætning til tidligere hvor grænsen var 250 fugle eller 600 æg. Disse bedrifter skal nu også registreres i Fødevareregionen og i CHR.

### **Indretning af løbegård:**

- For gråændernes vedkommende skal avlsdyrs løbegård, som noget nyt, være overdækket i trækperioden, af et stramtsiddende og eftergiveligt nylonnet med en maskestørrelse på max. 100 mm. Trækperioden er defineret fra 15. februar til 31. marts og fra 15. oktober til 30. november. Kravet om overdækning gælder også løbegårde hvori opdrættede ællinger og avlsdyr holdes sammen.
- Ænder og ællinger skal som noget nyt fodres og vandes under fast tag. Dette gælder ikke kun i trækperioden.
- Ænder skal nu have adgang til bassiner, i stedet for søer, vandhuller eller lignende, der ikke kan anvendes til formålet.

### **Hygiejne:**

- Bunden i bassinet/bassinerne skal være udformet i et materiale, som let kan rengøres og desinficeres.
- Vandet i bassinet skal udskiftes regelmæssigt. Dette vil sige mindst en gang om ugen hos avlsænder og hyppigere ved opdræt af ællinger.
- Udstyr og materiale, der har været brugt i produktionen, skal holdes rent. Umiddelbart efter tømning og før ny indsættelse af dyr skal udstyr og materiale rengøres og desinficeres, herunder regnes bassinet.

### **Direkte udsætning:**

- Opdrættede ællinger må ikke indsættes i andre besætninger, men skal altid udsættes direkte i naturen.
- Der må ikke ske opdræt af gråænder, herunder ællinger samtidig med salg af andre fjerkræarter og produkter heraf (kød og æg). Det er herved kun muligt at holde andet fjerkræ til eget forbrug. *Denne ændring er samtidig indført i bekendtgørelse nr. 125 af 5. marts 1996 om produktion af perlehøns, vagtler, duer, strudsefugle, fasaner og agerhøns samt ænder til udsætning i virksomheder, der ønsker at samhandle inden for EU.*
- Personer, der sætter fjervildt ud i naturen skal foretage optegnelser over udsætningsstedet. Optegnelserne skal opbevares i mindst 5 år fra optegnelsestidspunktet og skal på forlangende forevises repræsentanter for fødevareregionen. *Disse optegnelser kunne typisk indeholde oplysninger om dato, så præcis geografisk beskrivelse af udsætningstedet som muligt, antal og art udsat samt besætning hvorfra udsætningen er sket.*

## **Oversigt over regler i bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet vildt (AI-overvågningsbekendtgørelsen)**

*Bekendtgørelsen træder i kraft d. 15. februar 2006. Den ophæver samtidig bekendtgørelse 757 af 1. august 2005 om overvågning af aviær influenza hos fjerkræ og vilde fugle og bekendtgørelse nr. 1263 af 12. december 2005 om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ.*

*AI-overvågningsbekendtgørelsen i den endelige version har, i forhold til den version der har været sendt i høring, en ændring hvad angår hvilke besætninger reglerne gælder for. Der er tilføjet definitionen ”Besætninger med omsætning af levende fjerkræ og opdrættet fjervildt”, der defineres som, besætninger med levende fjerkræ og opdrættet vildt, der på omsætningstidspunktet har mere end 100 dyr, og som skal være registreret i fødevareregionen i henhold til bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af fjerkræ.*

*Reglerne vedrørende tidlig varsling for aviær influenza gælder derimod stadig for **alle** fjerkræhold.*

### **Risikoområder:**

- Landområder på 3 kilometer fra samtlige kyster og fjorde og diverse søer og åer, som beskrevet i bekendtgørelsen § 1, punkt 14. *Der er foruden 3 km grænsen, få ændringer i forhold til risikoområder defineret i bekendtgørelse nr. 1149 af 5. december 2005. Bekendtgørelse nr. 1149 vil blive revideret snarest.*

### **Tidlig varsling for aviær influenza:**

*Der er ingen ændringer i reglerne for tidlig varsling i forhold til bekendtgørelse nr. 1263 af 12. dec. 2005.*

- Reglerne omhandler overordnet ejerens eller den ansvarliges pligt til straks, at underrette fødevareregionen i tilfælde af fald i indtagelse af foder eller vand, fald i ægproduktionen eller overdødelighed. For besætninger på over 1000 dyr er der angivet specifikke tal for disse hændelsers størrelse.
- Ejer/ansvarlig forpligtes desuden til at indsende materiale efter fødevareregionens anvisninger.

### **Rutineovervågning for aviær influenza:**

*Rutineovervågningen erstatter tidligere overvågningsprogram for aviær influenza. Overvågningen omfatter ikke zoologiske haver, dyreparker og lignende, der kræver politiets tilladelse ifølge dyreværnsloven, samt strudse- og duehold.*

- Ejeren eller den ansvarlige af følgende besætningstyper med fjerkræ eller opdrættet vildt, er forpligtet til at udtage og indsende materiale til undersøgelse for aviær influenza:

- Avls-, centralopdrætnings- og formeringsvirksomheder med mere end 100 **høns eller kalkuner** efter følgende model:  
*I risikoområdet: 10 blodprøver 2 gange om året fra hver flok*  
*Uden for risikoområdet: 10 blodprøver 1 gang om året fra hver flok.*
- Opdrætningsvirksomheder med mere end 100 **høns**, efter følgende model:  
 Fra mindst 12 uger gamle kyllinger og senest 2 uger før flytning udtages og indsendes 10 blodprøver fra hver flok.
- Konsumægsvirksomheder med mere end 100 **høns**, efter følgende model:  
*Indendørs flokke i risikoområdet: 10 blodprøver 2 gange om året fra hver flok.*  
*Udegående flokke: 10 blodprøver 4 gange om året fra hver flok.*
- Besætninger med mere end 100 udegående **slagtekyllinger og slagtekalkuner**, efter følgende model:  
 1) Der udtages 10 blodprøver i besætningen inden dyrene sendes til slagtning eller  
 2) På slagteriet udtages 10 blodprøver fra besætningen.  
*Første prøvning udføres i besætningen. Herefter kan prøvninger udføres på slagteriet.*  
 Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 3 måneder.
- Avls-, centralopdrætnings- eller formeringsbesætninger med mere end 100 **ænder og gæs**, efter følgende model:  
*I risikoområdet: 45 blodprøver 2 gange om året fra hver flok*  
*Uden for risikoområdet: 45 blodprøver 1 gang om året fra hver flok*
- Besætninger med mere end 100 udegående **slagteænder**, herunder gråænder til slagtning eller **slagtegæs**, efter følgende model:  
 1) Der udtages 45 blodprøver i besætningen inden dyrene sendes til slagtning eller  
 2) På slagteriet udtages 45 blodprøver fra besætningen.  
*Første prøvning udføres i besætningen. Herefter kan prøvninger udføres på slagteriet.*  
 Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 3 måneder.
- Besætninger med mere end 100 **gråænder**, efter følgende model:  
 Der prøves 4 gange i sæsonen:  
 1) Der udtages 45 blodprøver af avlsdyr inden æglægningens begyndelse.  
 2) Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle ællinger fra første hold.  
 3) Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle ællinger midt i sæsonen.  
 4) Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle ællinger af sidste hold i sæsonen.
- Besætninger med mere end 100 **fasaner og agerhøns**, herunder rødhøns og stenhøns, efter følgende model:  
 Der prøves 4 gange i sæsonen:  
 1) Der udtages 10 blodprøver af avlsdyr inden æglægningens begyndelse.  
 2) Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle kyllinger fra første hold.  
 3) Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle kyllinger midt i sæsonen.  
 4) Der udtages 10 aflivede, mindst 2 uger gamle kyllinger af sidste hold i sæsonen.

- Ved **omsætning** af levende fjerkræ fra besætninger med mere end 100 dyr på omsætningstidspunktet, efter følgende model:
  - 1) Fra høns, kalkuner, perlehøns, fasaner, agerhøns, stenhøns og rødhøns udtages der 10 blodprøver.
  - 2) Fra ænder, herunder gråænder og gæs udtages der 45 blodprøver.Prøveresultaterne gælder for besætningen i op til 3 måneder.

#### **Indsendelse af materiale:**

- Materiale til undersøgelse for aviær influenza skal indsendes til Danmarks Fødevareresforskning.
- Alle resultaterne bliver af laboratoriet fremsendt til indsender. Resultater som følge af undersøgelser efter tidlig varsling indberettes til fødevareregionen. Positive resultater bliver desuden indberettet til Fødevarestyrelsens kontor for husdyrsundhed. Positive resultater som følge af rutineovervågningen for aviær influenza bliver straks indberettet til fødevareregionen og Fødevarestyrelsens kontor for husdyrsundhed. Alle resultater som følge af rutineovervågningen overføres til en database i Det Danske Fjerkræraad.
- Ejeren skal opbevare resultater af undersøgelserne i mindst 5 år.

#### **Omsætning af levende fjerkræ eller opdrættet fjervildt:**

- Ved omsætning af levende fjerkræ eller opdrættet fjervildt fra besætninger med mere end 100 dyr, skal dyrene være ledsaget af en informationsskrivelse, udfyldt af sælger, om at besætningen inden for de seneste 3 måneder er undersøgt for aviær influenza med negativt resultat. Undtaget er dog daggamle hønse- og kalkunkyllinger, daggamle ællinger og daggamle gæslinger fra registrerede rugerivirksomheder samt duer.
- Fjervildtrugerivirksomheder må kun modtage æg til rugning fra besætninger, der inden for de seneste 3 måneder har været undersøgt for aviær influenza med negativt resultat. Indsamlede gråandæg fra kunstige redepladser og æg fra ødelagte gråande-, fasan- og agerhønsereeder må ikke overdrages til en fjervildtrugerivirksomhed.